

ковые стороны у всех них одинаковы, а основания разные, у некоторых длиной  $\sqrt{2}$ , у других  $-\sqrt{24}$ . Поскольку треугольников разных типов поровну, то  $\angle AOC = 360^\circ : 6 = 60^\circ$ . Применяя свойство вписанного угла, находим

$$\angle ABC = 180^\circ - \frac{1}{2} \angle AOC = 150^\circ.$$

Теперь применим теорему косинусов:

$$AC^2 = 2 + 24 - 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{24} \cos 150^\circ = 38.$$

Поскольку треугольник  $AOC$  равносторонний,  $AO = AC = \sqrt{38}$ ; задача решена.

В задаче 4.3 при  $n = 1, 2$  и  $3$  значение выражения равно 10, 30 и 100 соответственно. Значит, двумя нулями сумма оканчиваться может.

Докажем, что  $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$  не может оканчиваться тремя нулями. Для этого достаточно доказать, что при  $n > 2$  эта сумма не кратна 8. Разумеется,  $1^n = 1$ ; каждое из чисел  $2^n$  и  $4^n$  кратно 8, а число  $3^n$  при делении на 8 дает либо остаток 3 (при нечетных  $n$ ), либо остаток 1 (при четных  $n$ ). Следовательно, сумма  $1^n + 2^n + 3^n + 4^n$  при делении на 8 дает остаток 4 или 2 и поэтому не кратна 8.

### Пятый тур

(25 минут; каждая задача – 9 баллов)

**5.1.** Найдите множество возможных значений выражения  $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma$ , где  $\alpha, \beta$  и  $\gamma$  – величины углов треугольника.

**5.2.** В тетраэдре  $PABC$  проведены биссектрисы  $PA_1, PB_1$  и  $PC_1$  треугольников  $PBC, PAC$  и  $PAB$  соответственно. Докажите, что прямые  $AA_1, BB_1$  и  $CC_1$  пересекаются в одной точке.

**5.3.** Сколько раз в последовательности  $a_1, a_2, a_3, \dots$ , заданной формулой

$$a_n = \left[ \sqrt{2n} + \frac{1}{2} \right], \text{ присутствует число } 1511?$$

Первое, что приходит в голову, когда видишь задачу 5.1 – тригонометрические преобразования:

$$\begin{aligned} \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma &= \\ &= \cos \alpha + \cos \beta + \cos(180^\circ - \alpha - \beta) = \\ &= \cos \alpha + \cos \beta - \cos(\alpha + \beta) = \\ &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} - 2 \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} + 1 = \\ &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \left( \cos \frac{\alpha - \beta}{2} - \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right) + 1 = \\ &= 4 \sin \frac{\gamma}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} + 1. \end{aligned}$$

Синусы половин углов треугольника – положительные числа, поэтому  $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma > 1$ .

Оценку снизу мы получили. Труднее

получить оценку сверху. Оказывается,

$$\sin \frac{\gamma}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} \leq \frac{1}{8},$$

так что  $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \leq \frac{3}{4}$ . (Равенство выполнено для равностороннего треугольника.) Для знатока геометрии это не представляет труда:

$$\sin \frac{\gamma}{2} \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\beta}{2} = r/(4R) \leq 1/8,$$

где  $r$  и  $R$  – радиусы вписанной и описанной окружностей треугольника. Впрочем, знаков и преобразованиями заниматься не стал бы, а сразу вспомнил бы формулу задачи 38 из 12-й главы «Задач по планиметрии» В.Прасолова:

$$\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = (r + R)/R,$$

после чего остается лишь заметить, что  $0 < r < R/2$ .

Разумеется, жюри не рассчитывало на такое решение. Надеялись, что кто-то догадается рассмотреть неравенство

$$\begin{aligned} \cos \alpha + \cos \beta &= \\ &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \leq 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \end{aligned}$$

и, поскольку

$$\cos \gamma = -\cos(\alpha + \beta) = -2 \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} + 1,$$

записать:

$$\begin{aligned} \cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma &\leq \\ &\leq 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} - 2 \cos^2 \frac{\alpha + \beta}{2} + 1 = \\ &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \left( 1 - \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right) + 1 \leq \frac{3}{2}, \end{aligned}$$

так как  $x(1-x) \leq 1/4$  при любом значении  $x$ , в частности при  $x = \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$ . После регаты выяснилось, что несколько команд успели придумать это решение, но слишком поздно: ни одна не успела его оформить.

Тем более никто не нашел способ, использующий скалярное произведение векторов. В этом замечательном решении главное – построить векторы единичной длины, перпендикулярные сторонам рассматриваемого треугольника. Если обозначить эти векторы буквами  $\vec{x}, \vec{y}$  и  $\vec{z}$  (рис.7), то

$$0 \leq \left( \vec{x} + \vec{y} + \vec{z} \right)^2 =$$




Рис. 7

$$\begin{aligned} &= \vec{x}^2 + \vec{y}^2 + \vec{z}^2 + 2\vec{x}\vec{y} + 2\vec{y}\vec{z} + 2\vec{z}\vec{x} = \\ &= 1 + 1 + 1 - 2 \cos \gamma - 2 \cos \alpha - 2 \cos \beta, \end{aligned}$$

откуда и получаем требуемое неравенство  $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma \leq 3/2$ .

Задачу 5.2 почти все команды решили, применив обратную теорему Чебы. А именно, они записали для каждого из треугольников  $PBC, PAC$  и  $PAB$  свойство биссектрисы:

$$BA_1/A_1C = BP/PC, \quad CB_1/B_1A = CP/PA, \quad AC_1/C_1B = AP/PB$$

и вычислили:

$$\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = \frac{BP}{PC} \cdot \frac{CP}{PA} \cdot \frac{AP}{PB} = 1.$$

Жюри знало и другое решение. Если отложить на лучах  $PA, PB$  и  $PC$  от точки  $P$  отрезки  $PA_2, PB_2$  и  $PC_2$  равной длины, то получим тетраэдр  $PA_2B_2C_2$ . Лучи  $PA_1, PB_1$  и  $PC_1$  пересекают ребра его основания в серединах. Осталось заметить, что медианы треугольника  $A_2B_2C_2$  пересекаются в одной точке, а отрезки  $AA_1, BB_1$  и  $CC_1$  являются образами этих медиан при проектировании треугольника  $A_2B_2C_2$  из центра  $P$  на треугольник  $ABC$ .

Задачу 5.3 решили почти все команды, раскрыв знак целой части:

$$1511 \leq \sqrt{2n} + \frac{1}{2} < 1512,$$

а затем не убоившись вычислений:

$$1510,5 \leq \sqrt{2n} < 1511,5,$$

$$2281610,25 \leq 2n < 2284632,25,$$

$$1140805,125 < n < 1142316,125.$$

Учитывая, что  $n$  – натуральное число, имеем  $1140805 < n \leq 1142316$ . Этому неравенству удовлетворяют  $1142316 - 1140805 = 1511$  натуральных чисел. Значит, ровно 1511 членов последовательности  $a_n$  равны 1511.

На обобщения времени на регате нет, но как только работы были сданы, все поняли, что последовательность, заданная в условии, – это последовательность 1; 2; 2; 3; 3; 3; 4; 4; 4; 4; 5; 5; 5; 5; 5; ... Каждое натуральное число  $n$  встречается в ней  $n$  раз.

Поскольку  $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$ , для доказательства этого замечательного свойства последовательности достаточно проверить, что ее член с номером  $n(n+1)/2$  не превышает  $n$ , а следующий член уже не меньше чем  $n+1$ . Проверка проста:

$$\begin{aligned} \sqrt{n(n+1)} + \frac{1}{2} &< \sqrt{n^2 + n} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \\ &= n + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = n + 1 \end{aligned}$$

и

$$\sqrt{n(n+1)+2} + \frac{1}{2} > \sqrt{n^2 + n} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = n + 1.$$

Публикацию подготовили  
А.Блинков, В.Спиров