

Рис. 9

Задача 4. На сторонах треугольника ABC построены квадраты (рис.9). Точка L – вершина одного квадрата, а точка K – середина стороны другого. Точка Q – вершина равнобедренного прямоугольного треугольника QDB , катеты которого $BD = DQ = (1/3)AB$. Докажите, что точки L, Q и K лежат на одной прямой и точка Q делит отрезок LK в отношении $2 : 1$.

Решение. Здесь $\alpha = 90^\circ, \beta = -90^\circ, m = 1, n = 1/2$. Поскольку в этой задаче $\alpha - \beta = 180^\circ$ и $m/n = 2$, то искомый полюс P лежит на отрезке LK и делит его в отношении $2 : 1$. Осталось только доказать, что полюс находится в точке Q , которая указана в условии задачи.




Рис. 10

Совместим точку C с точкой B (рис.10). Квадрат, построенный на стороне BC , вырождается в точку. Полюс P должен лежать на диагонали LB квадрата, построенного на стороне AB , и делить LB в отношении $2 : 1$, т.е. $PB = 0,5PL = (1/3)BL$. Отсюда $BD = (1/3)AB$, а точки P и Q совпадают.

Общий случай. Рассмотрим теперь решение конкретной задачи в общем случае, когда $\alpha \neq \beta$ и $m \neq n$.

Задача 5. На сторонах AC и BC треугольника ABC построены прямоугольные треугольники CLA и BKC




Рис. 11

с острым углом 30° (рис.11). Точка Q делит отрезок AB в отношении $AQ : QB = 3 : 1$. Докажите, что треугольник LQK прямоугольный.




Рис. 12

Решение. Здесь мы имеем такие соотношения: $\alpha = 30^\circ, \beta = -60^\circ, \alpha - \beta = 90^\circ, m = AL/AC = \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2, n = BK/BC = \cos 60^\circ = 1/2, m/n = \sqrt{3}$. Найдем полюс P в этом случае. Совместим точку C с точкой B . При этом треугольник BKC вырождается в точку, треугольник CLA займет положение, показанное на рисунке 12. В данном случае, поскольку $\alpha - \beta = 90^\circ$ и $m/n = \sqrt{3}$, полюс P является вершиной прямого угла прямоугольного

Случай $\alpha - \beta = 180^\circ$. В этом случае треугольник PLK вырождается в отрезок, и искомый полюс P лежит внутри отрезка LK и делит его в отношении $m : n$.

треугольника с гипотенузой BL и отношением катетов $PL : PK = m/n = \sqrt{3}$. Легко проверить, что точка Q , заданная в условии задачи, отвечает этим требованиям.

Тем самым получается, что полюс P совпадает с точкой Q . Отсюда и следует, что треугольник LQK – прямоугольный.

В самом общем случае отыскание полюса P сводится к задаче нахождения точки пересечения двух окружностей (или двух дуг окружностей). Одна из них – множество точек, из которых отрезок KL виден под углом $\alpha - \beta$. Другая – множество точек, для которых отношение расстояний до двух данных точек K, L постоянно и равно m/n , это окружность Аполлония.

Теперь ясно, что возможны и другие специальные случаи, отличные от вышеприведенных трех. Например, при $m = n$ окружность Аполлония заменяется на серединный перпендикуляр отрезка KL , а при $\alpha - \beta = 90^\circ$ полюс P лежит на окружности с диаметром KL . Из этих рассуждений ясно, что полюс существует всегда, за исключением единственного случая, когда $\alpha - \beta = 0^\circ$ и $m = n$. Можно сказать, что здесь полюс «уходит в бесконечность».

В этом случае можно воспользоваться формулой (8), которая примет вид $\vec{r}_L = \vec{r}_K + \vec{R}$, или $\vec{r}_L - \vec{r}_K = \vec{R}$, что равносильно равенству $\overline{KL} = \vec{R}$ (в таком случае говорят, что отрезок KL движется поступательно). Последнее равенство означает, что вектор \overline{KL} не зависит от положения точки C .

Задача 6. На сторонах треугольника ABC построены прямоугольные треугольники CLA и CKB с острыми углами α и γ (рис.13). Докажите, что $KL = AB \cos \gamma$ и KL образует с прямой AB угол γ .




Рис. 13

Решение. В этой задаче $\alpha - \beta = 0^\circ, m = n = \cos \alpha$, т.е. $\overline{KL} = \vec{R}$. В качестве определяющего положения точки C выберем такое, когда она совмещена с точкой B . Тогда и точка K совпадет с точкой B (треугольник BCK вырождается в точку). При этом $KL = AB \cos \gamma$ и образует с прямой AB угол γ , что и требовалось доказать (рис.14).

Из разобранных задач ясно, что главный момент решения – нахождение полюса относительно заданного в условии треугольника.

Более того, становится ясно, как составлять задачи такого рода. Можно взять треугольник, два «хороших» угла α и β (например такие, чтобы их разность была $0^\circ, 90^\circ$ или 180°), два удобных числа, найти при этих данных полюс. Затем указать три точки, соответствующие выбранным углам, числам и полюсу. И сформулировать задачу о взаимном положении полученных трех точек. Попробуйте!

(Напоминаем, что ориентация вершин треугольников и четырехугольников – против часовой стрелки.




Рис. 14