

8. Положим $S(n) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \frac{A(n)}{B(n)}$, где $A(n)$ и $B(n)$ взаимно просты. Нам понадобится оценка $B(n) > n/2$.

Предположим, что при всех $n \geq n_0$ число $A(n)$ является степенью простого. Пусть $p > n_0 + 5$ – простое число. Тогда $A(p-1)$ делится на p (слагаемые суммы $S(p-1)$ разбиваются на пары, для каждой из которых числитель суммы делится на p). Следовательно, $A(p-1) = p^k$, $k \in \mathbf{N}$.

Далее, докажем, что числитель $A(p^n - 1)$ также кратен p (и, стало быть, является степенью p) при всех натуральных n . Проведем индукцию по n . База доказана. Переход $n-1 \rightarrow n$.

Имеем $S(p^n - 1) = S(p^{n-1} - 1)/p + S'$, где $S' = \sum_{d \leq p^n - 1, d: p} \frac{1}{d}$ (первое слагаемое как раз равно сумме слагаемых со знаменателями, делящимися на p). Сумма S' разбивается на несколько (а именно, p^{n-1}) сумм вида

$$\sum_{i=1}^{p-1} \frac{1}{pk+i}, \quad k = 0, 1, \dots, p^{n-1} - 1.$$

Каждая из них имеет числитель, делящийся на p , что устанавливается так же, как и для $S(p-1)$. Осталось убедиться, что числитель дроби $S(p^{n-1} - 1)/p$ делится на p . Действительно, $A(p^{n-1} - 1) = p^s$ в силу индукционного предположения, причем $s > 1$ (вспомним, что $B(p^{n-1} - 1) \geq p^{n-1}/2 \geq p/2$, а $S(p^{n-1} - 1) \geq S(n_0 + 4) \geq S(4) > 2$). Положим

$$H_p(n) = S(p^n - p) - S(p^n - 1) = \sum_{i=1}^{p-1} 1/(-p^n + i).$$

Если $n > k$, то числитель дроби $H_p(n)$ делится на p^k , но не на p^{k+1} (ибо $H_p(n) - S(p-1)$ – дробь, числитель которой делится на p^n). Отсюда получаем, что оба числителя $A(p^n - 1)$ и $A(p^n - p)$ делятся на p , но один из них не делится на p^{k+1} . Значит, одна из дробей $S(p^n - 1)$ и $S(p^n - p)$ не превосходит $\frac{2p^k}{(p^n - p)} < 1$ при $n = k + 2$ – противоречие.

XXXVI Всероссийская олимпиада школьников по физике

Теоретический тур

9 класс

1. $\rho = \frac{3\pi(1+n)^3}{GT^2} \approx 653 \text{ кг/м}^3$.

2. Решение этой задачи (а также некоторых других задач) будет опубликовано позже в «Задачнике «Кванта».




Рис. 12

4. 1) При $V \leq 2U_0$
 $\eta_1 = 0,5$; при $V = 4U_0$
 $\eta_1 = 0,75$.
 2) ВАХ получается сложением напряжений для каждого фиксированного значения силы тока (см. рис.12); $\eta_2 = 0,75$.
 3) ВАХ получается сложением сил токов для каждого фиксированного значения напряжения (см. рис.13); $\eta_3 = 0,5$.

10 класс

1. Есть предельная скорость v_0 , не зависящая от мощности. При этой скорости $F_{\text{сопр}} = F_{\text{тр max}}$, откуда $v_0 = \sqrt{\mu mg/k} \approx 71 \text{ м/с}$. С другой стороны, для поддержания постоянной скорости требуется мощность $N = F_{\text{сопр}}v = kv^3$, откуда получаем

$v_{\text{max}}(N) = (N/k)^{1/3}$. Скорость перестает расти начиная с мощности $N_0 = \mu mg \sqrt{\mu mg/k} \approx 70 \text{ кВт}$.

2. $H \approx 2,8 \text{ м}$; пройденные пути совпадают.

3. Искомую температуру найдем из квадратного уравнения $\frac{(T_1 - T_2)^2}{(T_3 - T_x)^2} = \frac{T_2}{T_x}$, откуда $T_{x1} = 232 \text{ К}$, т.е. $t_{x1} = -41 \text{ }^\circ\text{C}$, а второй корень $T_{x2} = 338 \text{ К}$ не подходит – он отвечает работе агрегата в качестве теплового насоса.

5. $Q_1 = CE^2/2$, $Q_2 = CE^2/4$.

11 класс

1. $x_0 = \frac{\omega^2}{3ag}$, $y_0 = \frac{\omega^6}{27a^2g^3}$; $T = \frac{2\pi}{\omega} \sqrt{1 + \frac{\omega^8}{9a^2g^4}}$.




Рис. 13

КВАНТ

НОМЕР ПОДГОТОВИЛИ

А.А.Егоров, Л.В.Кардасевич, С.П.Коновалов, А.Ю.Котова, В.А.Тихомирова, А.И.Черноуцан

НОМЕР ОФОРМИЛИ

В.Д.Акатьева, Д.Н.Гришукова, В.В.Иванюк, А.И.Пацхверия, Л.В.Тишков, П.И.Чернуский

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Е.В.Морозова

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРУППА

Е.А.Митченко, Л.В.Калиничева

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ

Л.З.Симакова

Журнал «Квант» зарегистрирован в Комитете РФ по печати.

Рег. св-во №0110473

Адрес редакции:

119296 Москва, Ленинский проспект, 64-А, «Квант», тел. 930-56-48

Отпечатано на Ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате Комитета Российской Федерации по печати 142300 г.Чехов Московской области Заказ №